

## ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

## ГЛИЦЕРИН

**Регистрационный номер:****Торговое наименование:** Глицерин**Международное непатентованное наименование:** Глицерол**Лекарственная форма:** суппозитории ректальные**Состав на 1 суппозиторий.** 1,24 г 2,11 г*Действующее вещество:*

Глицерол (в пересчете на 100 % содержание глицерола) 1,24 г 2,11 г

*Вспомогательные вещества:*

Макрогол 400 (полиэтиленоксид 400) 0,12 г 0,21 г

Стеариновая кислота 0,12 г 0,205 г

Натрия карбоната декагидрат 0,060 г 0,103 г

**Описание:** Суппозитории торпедообразной формы, прозрачные или полупрозрачные, почти бесцветные или с желтовато-коричневым оттенком, с мажущей поверхностью, гигроскопичны. Допускается помутнение суппозитория, незначительное размягчение поверхностного слоя и подпотевание контурной упаковки. На срезе допускается наличие воздушного стержня.

**Фармакотерапевтическая группа:** слабительное средство.**Код АТХ:** А06АХ01**Фармакологическое действие**

Слабительное средство. При использовании в виде ректальных суппозиториях смягчает и смазывает затвердевшие фекальные массы, облегчает их прохождение по толстой кишке, оказывает раздражающее действие на слизистую оболочку кишечника, рефлекторно стимулируя моторику кишечника, инициирует процесс дефекации, облегчает прохождение и выведение каловых масс.

**Фармакокинетика**

Активно метаболизируется в печени. Выводится через почки, в неизменном виде выделяется 7-14 %.

**Показания к применению**

Симптоматическое лечение запоров различной этиологии (когда использование пероральных препаратов невозможно).

Профилактика запоров у пациентов, которые не могут напрягаться при дефекации: болезненный тромбированный геморрой, трещины заднего прохода или периаанальный абсцесс, аноректальный стеноз, после перенесенного инфаркта миокарда.

### **Противопоказания**

Повышенная чувствительность к глицеролу или любому из компонентов препарата. Синдром раздраженного кишечника, кишечная непроходимость, аппендицит, кровотечение, диарея, геморрой в стадии обострения, трещины заднего прохода, воспалительные заболевания и опухоли прямой кишки, недиагностированная боль в животе, геморрагический ректоколит, детский возраст до 5 лет.

### **С осторожностью**

Почечная недостаточность.

### **Применение при беременности и лактации**

При беременности применение противопоказано из-за возможной рефлекторной стимуляции матки.

Неизвестно, экскретируется ли глицерин в грудное молоко, поэтому данный лекарственный препарат используется, только если, по мнению врача, ожидаемая польза для матери превышает потенциальный риск для плода.

### **Способ применения и дозы**

Ректально.

Вводят препарат в прямую кишку и оставляют там не менее 5 минут. Обычно дефекация происходит через 5-10 минут после введения средства. Остатки суппозитория выводятся из кишечника с калом.

Детям с 5 до 12 лет назначают по 1 суппозиторию, содержащему 1,24 г глицерина, 1 раз в сутки.

Детям старше 12 лет и взрослым назначают по 1 суппозиторию, содержащему 2,11 г глицерина, 1 раз в сутки. При необходимости дозу повышают до 2 суппозитория в сутки.

### **Побочные эффекты**

Аллергические реакции, местные реакции (зуд, жжение в области ануса), появление спастических болей в области кишечника. Проходит самостоятельно после отмены препарата.

При длительном применении возможны явления раздражения прямой кишки, ослабление физиологического процесса дефекации.

При развитии побочных эффектов следует обратиться к врачу.

**Передозировка**

Симптомом передозировки является частый жидкий стул. В случае передозировки следует отменить препарат.

**Взаимодействие с другими лекарственными средствами**

Нет данных.

**Особые указания**

Перед и после использования суппозиториев следует тщательно вымыть руки. Систематический прием не рекомендуется. Лечение прекращают после восстановления нормальной перистальтики кишечника. Не рекомендуется использовать суппозитории курсом дольше 1 недели.

Не смазывать суппозитории минеральными жидкими или твердыми маслами.

**Влияние на способность управлять транспортным средством и работать с механизмами**

Не установлено.

**Форма выпуска**

Суппозитории ректальные 1,24 г или 2,11 г.

По 5 суппозиториев в контурной ячейковой упаковке из полимерной пленки ПВХ/ПЭ или комбинированной из алюминиевой фольги и ПЭ.

Две контурных ячейковых упаковки с пятью суппозиториями помещают вместе с инструкцией по медицинскому применению препарата в пачку из картона.

**Условия хранения**

При температуре не выше 25 °С.

Хранить в недоступном для детей месте.

**Срок годности**

2 года.

Не применять после истечения срока годности, указанного на упаковке.

**Условия отпуска**

Отпускают по рецепту.

**Владелец регистрационного удостоверения**

ООО «Фарманова»

142000, Россия, Московская область, г. Домодедово, микрорайон Северный.

ул. Индустриальная, строение 1, офис 409

МИНЗДРАВ РОССИИ 4

ЛП - 005182 - 191118

СОГЛАСОВАНО

Производитель/организация, принимающая претензии потребителей

ООО «БиоФармКомбинат»

391734, Россия, Рязанская обл., Михайловский район, пос. Коровинский спиртзавод.

тел./факс: (4912) 428-606.


e-mail: info@bio-farm.com

Генеральный директор

ООО «Фарманова»



Гюлькин А.Н.



109459