


ИНСТРУКЦИЯ

по медицинскому применению лекарственного препарата

ПРОСТАТЫ ЭКСТРАКТ



Регистрационный номер:

Торговое наименование: Простаты экстракт

Международное непатентованное или группировочное наименование:

Простаты экстракт.

Лекарственная форма: суппозитории ректальные

Состав на 1 суппозиторий:

Действующее вещество: простаты экстракт – 50 мг (в пересчете на водорастворимые пептиды -- 10 мг).

Вспомогательное вещество: жир твердый – до 1,25 г.

Описание:

Суппозитории торпедообразной формы от белого до белого с желтоватым или серовато-буроватым оттенком цвета. Допускается наличие на срезе воздушного стержня и воронкообразного углубления.

Фармакотерапевтическая группа:

Средство лечения хронического простатита.

Код АТХ: G04ВХ.

Фармакологические свойства

Фармакодинамика

Простаты экстракт обладает органотропным действием на предстательную железу. Уменьшает степень отека, лейкоцитарной инфильтрации предстательной железы, нормализует секреторную функцию эпителиальных клеток, увеличивает число лецитиновых зерен в секрете ацинусов, стимулирует мышечный тонус мочевого пузыря. Улучшает микроциркуляцию в предстательной железе за счет уменьшения тромбообразования, антиагрегантной активности, препятствует развитию тромбоза венул в предстательной железе.

Препарат нормализует параметры предстательной железы и эякулята. Уменьшает боль и дискомфорт, устраняет дизурические явления, улучшает копулятивную функцию.

Фармакокинетика

Как пептидный препарат, расщепляется клеточными протеазами до аминокислот.

Кумулятивного действия не имеет.

Показания к применению

Хронический простатит.

Состояния до и после оперативных вмешательств на предстательной железе, доброкачественная гиперплазия предстательной железы.

Противопоказания

Повышенная чувствительность к компонентам препарата, диарея.

Способ применения и дозы

Ректально. После опорожнения кишечника суппозиторий вводят глубоко в задний проход.

Назначают по 1 суппозиторию в день.

После введения суппозитория желателно пребывание пациента в постели в течение 30-40 минут.

Продолжительность курса лечения составляет не менее 10 дней. При необходимости курс лечения повторяют.

Если после лечения улучшения не наступает или симптомы усугубляются, или появляются новые симптомы, необходимо проконсультироваться с врачом.

Побочное действие

Возможны аллергические реакции. Если у Вас отмечаются побочные эффекты, указанные в инструкции, или они усугубляются, или Вы заметили любые другие побочные эффекты, не указанные в инструкции, сообщите об этом врачу.

Передозировка

Случаи передозировки не описаны.

Взаимодействие с другими лекарственными средствами

Препарат может применяться в комплексной терапии.

Случаи взаимодействия или несовместимости с другими лекарственными средствами не описаны.

Особые указания

Применяют только для лечения взрослых мужчин; не применяют у женщин и детей.

МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 007404-150921
СОГЛАСОВАНО

Лечение хронического простатита должно быть комплексным, предполагающим наряду с назначением препарата применение других групп лекарственных препаратов и немедикаментозных методов лечения.

До начала лечения хронического простатита и, при необходимости, в процессе лечения рекомендуется проводить анализ секрета предстательной железы.

В период применения препарата для лечения доброкачественной гиперплазии предстательной железы следует регулярно посещать врача для проведения стандартного контроля данного заболевания. Прежде чем начать курс лечения необходимо убедиться, что патология носит доброкачественный характер.

Влияние на способность управлять транспортными средствами, механизмами

Применение препарата не оказывает влияния на способность к выполнению потенциально опасных видов деятельности, требующих повышенной концентрации внимания и быстроты психомоторных реакций (в том числе управление транспортными средствами, работа с движущимися механизмами, работа диспетчера, оператора).

Форма выпуска

Суппозитории ректальные 10 мг.

По 5 суппозитория в контурную ячейковую упаковку из пленки полимерной ПВХ/ПЭ.

По 1, 2 или 3 контурных ячейковых упаковок помещают вместе с инструкцией по медицинскому применению в пачку картонную.

Срок годности

2 года. Не применять по истечении срока годности.

Условия хранения

При температуре не выше 25 °С в оригинальной упаковке.

Хранить в недоступном для детей месте!

Условия отпуска

Отпускают без рецепта.

Владелец Регистрационного удостоверения

ООО «Б-ФАРМ», Россия

143026, Московская обл., г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, стр. 2А, ком.2

Тел.: +7 (499) 145-59-99

Организация, принимающая претензии для потребителей

ООО «Б-ФАРМ», Россия

Почтовый адрес: 143026, Московская обл., г.о. Одинцовский, р.п. Новоивановское, ул. Агрохимиков, стр. 2А, а/я 80/1039.

Тел.: +7 (499) 145-59-99, тел. Горячей линии: +7 (926) 601-20-45.

e-mail: inbox@b-pharm.ru

Производитель

ООО «БиоФармКомбинат», Россия

Рязанская обл., Михайловский район, пос. Коровинского-синиртзавода.


МИНЗДРАВ РОССИИ
ЛП - 007404-15092
СОГЛАСОВАНО

Генеральный директор

ООО «Б-ФАРМ»



Кульчицкий П.С.



131914

Прочитано и проинформировано и скреплено
печатью 4 листа(ов).
Доляжность, ФИО

Генеральный директор
Кульчицкий П.С.
(подпись)

