

Церебрин

Действующее вещество (МНН): ~

Форма выпуска и фасовка: Раствор для инъекций ампулы 1 мл №10, 2 мл №10, 5 мл №5, флаконы 10 мл №5, 20 мл №5

Способ применения и дозы

Применяется парентерально. Дозы и продолжительность лечения зависят от характера и тяжести заболевания, а также от возраста больного. Возможно назначение однократных доз, величина которых может достигать 50 мл, однако более предпочтительно проведение курса лечения.

Рекомендуемый оптимальный курс лечения представляет собой ежедневные инъекции в течение 10-20 дней.

Болезнь Альцгеймера	10 – 30 мл
Синдром когнитивных нарушений различного генеза, включая деменцию	5 – 30 мл
Хроническая цереброваскулярная недостаточность (хроническая ишемия мозга, дисциркуляторная энцефалопатия)	5 – 20 мл
Ишемический инсульт: - острый период - восстановительный период	10 – 50 мл 5 – 30 мл
Черепно-мозговая травма	5 – 50 мл
Задержка умственного развития у детей	0,1 – 0,2 мл/кг массы
Гиперактивность и дефицит внимания у детей	0,1 – 0,2 мл/кг массы
В комплексной терапии – при эндогенной депрессии, резистентной к антидепрессантам	5 – 30 мл

Для повышения эффективности лечения могут быть проведены повторные курсы до тех пор, пока наблюдается улучшение состояния пациента вследствие лечения. После проведения первого курса кратность введения препарата может быть снижена до 2 или 3 раз в неделю.

Препарат Церебрин применяют в виде инъекций: внутримышечно (до 5 мл) и внутривенно (до 10 мл). Дозы от 10 мл до 50 мл рекомендуется вводить только посредством медленных внутривенных инфузий после разведения предложенными стандартными растворами для инфузий. Продолжительность инфузии составляет от 15 до 60 минут.